



VIR MEER INLIGTING: +27 12 817 9060 - www.afrivet.co.za

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy. Reg. No.: 2000/011263/07,

Posbus 2009, Faerie Glen, 0043, RSA, **Tel:** +27 12 817 9060, **Web:** www.afrivet.co.za, **Hulplyn:** 0860 833 2787

'n Uifers doeltreffende, ekonomiese ontsmettingsmiddel
vir gebruik op harde oppervlaktes in veefasiliteite en omgewing.

A.C.T.

LONG ACTING DISINFECTANT


RSA Reg. No.: NRCS/8054/289982/1189

JOU VENNOOT IN BIOSEKURITEIT

Wetenskaplik bewys om tot **99.999%** van bakterieë, swamme en virusse te dood.

BESKERM JOU DIERE TEEN MEESTE VAN DIE
EKONOMIES BELANGRIKSTE VEESIEKTES, INSLOTEND
BEK-EN-KLOUSEER EN AFRIKA-VARKPES.

- Roes-weerstandig
- Nie skadelik vir die omgewing nie
- Nawerking tot en met 7 dae op oppervlaktes
- Beschikbaar in 150 ml gereed-vir-gebruik en 1 L, 5 L & 20 L konsentraat



RSA Reg. No.: NRCS/8054/289982/1189. **Bevat:** Didesieldimetiëlammoniumchloried 0.2 - 0.3 %; beniel-C12-14-alkieldimetiëchloried 0.2 - 0.3 %; polihexametiëlenbiguanied-hidrochloried 0.5 - 0.6 %
Registrasiehouer: RBT24/7, Building C, 5 Regency Drive, Route 21, Irene, Pretoria.
Verspreider: Afrivet Business Management (Pty) Ltd, Co. Reg. No. 2000/011263/07.
Posbus 2009, Faerie Glen, 0043, RSA. **Tel:** +27 12 817 9060. **Web:** www.afrivet.co.za. **Hulplyn:** 0860 833 2787.
VIR MEER INSIGTING: 0860 833 2787 of +27 12 817 9060
ACTLA-AD-24-MB-V1

 **Afrivet**
Animal health is in our DNA
A Bimeda company

LEWENDEHAWE VERKOOPSPAN

BI 1

ANTIBIOTIKAS:

ULTRATET
ULTRATET LA
ULTRATET LA 200
ECOSULF L.A.
ECO NAGEBOORTE STEEKPILLE

BI 2
BI 2
BI 2
BI 3
BI 3

UITWENDIGE PARASIETMIDDEL:

AFRIVET® 5 % REDLINE ACARICIDAL BALLS
AFRIVET® 10 % REDLINE ACARICIDAL BALLS
AFRIVET® REDLINE POUR-ON
DELTAPOR® 5
DELTAPOR® 10 PLUS
TIXAGON® 2%
ERADITICK® CATTLE POUR-ON
ERADITICK® PIG POUR-ON
ERADITICK® PLUS POUR-ON
ERADITICK® 125
ERADITICK® 250
ERADITICK® ULTRA
ERADITICK® GREASE
DELTA FORCE 100
EXPEL PLUS JETTING FLUID
ECOBASH

BI 4
BI 4
BI 4
BI 5
BI 5
BI 5
BI 6
BI 6
BI 6
BI 6
BI 7
BI 7
BI 7
BI 8
BI 8
BI 8
BI 9

INWENDIGE PARASIETMIDDEL:

ECOFLUKE
ECOTEL 2.5 %
ERADIWORM® CONCENTRATE
ERADIWORM® 25
ERADIWORM® TAPE
ERADIWORM® PLUS
ECOMINTIC 50
OSTRIDOSE
MOXZIBEN
CLOSECO 7.5 %
ECOMECTIN 1 %
ECOMECTIN PIG PREMIX
ECOMECTIN SHEEP DRENCH

BI 9
BI 9
BI 10
BI 10
BI 10
BI 11
BI 11
BI 11
BI 12
BI 12
BI 12
BI 13
BI 13

VITAMIEËNE / MINERALE:

VIT-AID
OVI-MIN® GEL
OVI-MIN® + CU GEL
BOVI-MIN® GEL
DAIRY-MIN® GEL
DAIRY-MIN® SUPER
ELECTRO GUARD® NF GEL
CALCIMAX® RTU
AFRI-VIT P
AFRI-VIT STRESS
FIBREMAX

BI 14
BI 14
BI 14
BI 15
BI 15
BI 15
BI 16
BI 16
BI 17
BI 17
BI 17

VOERBYVOEGSEL:

CHLORTET FG 200
TYLECO FG 100
AIVLOSIN WATER SOLUBLE POWDER

BI 18
BI 18
BI 19

ENTSTOWWE:

SALMONELLA VACCINE
WIREVAX

BI 20
BI 20

HITTESTRES OPLOSSING:

BETAMINT

BI 21

VLIEGBEHEER:

MISTIFLY® GREEN
ERADIFLY® GRANULAR

BI 22
BI 22

INSEKBEHEER:

ICON® 10 CS

BI 22

WOND BEHANDELING:

EXPEL WOUND OIL
EXPEL WOUND SPRAY
FUTASPRAY

BI 23
BI 23
BI 23

SEËLMIDDEL:

STOCKHOLM TAR SPRAY

BI 24

ONTSMETTINGSMIDDELS:

A.C.T. CLEANING FLUID®
A.C.T. LONG ACTING DISINFECTANT

BI 24
BI 24

TOERUSTING:

TERMOMETER
GEWIGSMAATBAND

BI 25
BI 25

ADDSIONELE KONTAKBESONDERHEDE

BI 26

INENTINGS- & DOSERINGSPROGRAMME:

INENTINGSPROGRAM VIR
VLEISBEESTE OP DIE VELD
INENTINGSPROGRAM VIR MELKBEESTE
INENTINGSPROGRAM VIR SKAPE
KLEINVEE DOSERINGSPROGRAM
GEBASEER OP TEELSIKLUS
INENTINGSPROGRAM VIR BOKKE
INENTINGSPROGRAM VIR BRAAIKUIKENS
INENTINGSPROGRAM VIR VARKE
OPSIONELE INENTINGS

BI 27
BI 27
BI 28
BI 28
BI 28
BI 28
BI 29
BI 29
BI 30
BI 30

DIP KALIBRASIE

BI 31

OUERDOMBEPALING VAN SKAPE EN BOKKE DEUR HUL TANDE

BI 32

OUERDOMSBEPALING VAN BEESTE DEUR HUL TANDE

BI 32



LEWENDEHAWE VERKOOPSPAN

Noordelike Suid-Afrika & Eswatini

Francois Smit	073 254 2475	Streeksverkoopsbestuurder en Eswatini			
Hesmarie Barkhuizen	082 324 2966	Fanie Ungerer	083 404 9464	Frik van der Walt	082 432 7900
Hein Sutherland	083 388 1003	Thea Pauley	078 651 4706	Thato Khunou	083 641 6849

Sentraal Suid-Afrika

Riaan Vermeulen	082 896 4420	Streeksverkoopsbestuurder en Voerkrale			
Lee-Ann Terblanche	079 287 2390	Louis van Bratt	071 874 4430	Danie du Toit	071 018 5910
Jannie de Klerk	082 564 3139	Henk Steyn	082 899 9406	Derek Coyne	082 719 8511

Suidelike Suid-Afrika & Namibië

Ivahn van Niekerk	082 410 9517	Streeksverkoopsbestuurder			
Benjamin Jansen van Vuuren	083 666 1364	Jacques de Villiers	066 295 9111	Japie van Rooyen	079 496 2332
Francois du Toit	076 868 0492	Gareth Webster	072 508 3381	Jaco Smit	082 877 0549
Charl Vorster	084 812 7378	Christelle Jooste	0026 481 470 7406		

VARKE & PLUIMVEE

Blanche de Lange	082 043 4735	Besigheidsenheid-bestuurder			
------------------	--------------	-----------------------------	--	--	--

UITVOERE

Ratselane Marumo	073 595 9774	Uitvoerbestuurder Suidelike-Afrika			
Cobus Campher	+267 7277 2330	Kommersiële Bestuurder: Botswana			

VIR MEER INLIGTING: 0860 833 2787 of +27 12 817 9060

Afrivet Business Management (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.: 2000/011263/07,
Posbus 2009, Faerie Glen, 0043, RSA. Tel: +27 12 817 9060, Web: www.afrivet.co.za.

ANIMAL HEALTH IS IN OUR DNA

MAP2-AD-23-M7-V1

ULTRATET

ANTIBIOTIKA - TETRASIEN INSPUITBAAR

Oksitetrasiklienhydrochloried 125 mg / ml



Verpakking beskikbaar:
100 ml, 500 ml



RSA Reg. No.: G0296 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSQ V03/17.1.2/698

Vir die behandeling van bosluisoorgedraagde galsiekte (anaplasmose), hartwater, vrotpootjie, longontsteking, naelstringsiekte en septiese gewrigsontsteking in beeste, skape, bokke en varke asook nuwesiekte in perde.

Toediening: IM, SK, of IV.
Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.
Melk: 48 uur.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 8 ml / 100 kg  4 ml / 50 kg  1 ml / 25 kg  4 ml / 100 kg

ULTRATET LA

ANTIBIOTIKA - TETRASIEN INSPUITBAAR

Oksitetrasiklienhydrochloried 230 mg / ml



Verpakking beskikbaar:
100 ml, 500 ml



RSA Reg. No.: G2857 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSQ V01/18.1.2/307

Vir die behandeling en beheer van siektes veroorsaak deur, of wat verband hou met organismes wat vatbaar is vir oksitetrasiklien. Die langwerking daarvan word aanbeveel waar vir veteriniere, praktiese of ekonomiese redes dit ontmootlik of onwenslik is om diere meer dikwels te hanteer en te behandel.

Beeste: Vir die behandeling van bosluisoorgedraagde galsiekte (anaplasmose), hartwater, vrotpootjie, longontsteking, naelstringsiekte en septiese gewrigsontsteking.

Skape en Bokke: Vir die behandeling van hartwater, vrotpootjie, longontsteking, naelstringsiekte en septiese gewrigsontsteking.

Varke: Vir die behandeling van vrotpootjie, longontsteking, naelstringsiekte en septiese gewrigsontsteking.

Toediening: IM (SK vir varke <10kg).
Onttrekkingsperiode - Vleis: 28 dae.
Melk: 5 dae.

Registrasiehouer:
ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 1992/000835/07

 1 ml / 10 kg  1 ml / 10 kg  1 ml / 10 kg (oor 20 kg)

ULTRATET LA 200

ANTIBIOTIKA - TETRASIEN INSPUITBAAR

Oksitetrasiklienhidraat 200 mg / ml



Verpakking beskikbaar:
100 ml, 500 ml



RSA Reg. No.: G3559 (Wet 36/1947)

Beeste: Behandeling van bosluisoorgedraagde galsiekte (anaplasmose), hartwater, longontsteking, vrotpootjie, septiese gewrigsontsteking, naelstringontsteking en oogslymvliesontsteking (aansteeklike keratokonjunktivitis).

Skape en bokke: Behandeling van hartwater, longontsteking, vrotpootjie, septiese gewrigsontsteking en naelstringontsteking.

Varke: Behandeling van longontsteking, septiese gewrigsontsteking en naelstringontsteking.

Toediening: IM (SK vir varke <20kg).
Onttrekkingsperiode - Vleis: 28 dae.
Melk: 5 dae.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 1 ml / 10 kg  1 ml / 10 kg  1 ml / 10 kg (oor 20 kg)

ECOSULF L.A.

ANTIBIOTIKA - SULFAS INSPUITBAAR

Natriumsulfadimetoksien 40 % m/v



Verpakking beskikbaar:
100 ml, 500 ml



RSA Reg. No.: G3037 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSOV02/17.1.7/705

Beeste, skape en bokke: Vrotpootjie, longontsteking, naelstringsiekte en septiese gewrigsontsteking.

Perde: Longontsteking, nuwesiekte, septiese gewrigsontsteking en naelstringsiekte.

Varke: Longontsteking en septiese gewrigsontsteking.

Kalwers en lammers: Koksidiëse en bakteriële maagwerking.

Toediening: SK of IV.

Onttrekingsperiode - Vleis: 7 dae.

Melk: 48 uur.

Registrasiehouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.1992/000835/07

Eerste dosis 1 - 2 ml / 10 kg 1 - 2 ml / 10 kg 1 - 2 ml / 10 kg 1 - 2 ml / 10 kg

ECO NAGEBOORTE STEEKPILLE

ANTIBIOTIKA - STEEKPILLE

Oksitetrasiklien 375 mg; sulfadimidien 125 mg; sulfatiasool 125 mg; setrimied 10 mg; sulfadiazien 125 mg / steekpil



Verpakking beskikbaar:
1 x 6 Steekpille



RSA Reg. No.: G3115 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSOV03/17.1.10/700

Vir die behandeling van bakteriële infeksies van die vagina en baarmoeder na die afloop van 'n moeilike geboorte en/of agtergeblewe nageboorte by beeste, skape, bokke, varke en perde.

Onttrekingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrasiehouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.1992/000835/07

2 steekpille 1/2 steekpil 1 steekpil 2 steekpille



AFRIVET® 5 % REDLINE ACARICIDAL BALLS



UITWENDIGE PARASIETMIDDEL - BOSLUISDODENDE BALLETTJIES

Flumetrien 5 % m/v

RSA Reg. No.: G4228 (Wet 36/1947)



Vir die beheer van bosluise op blesbokke, koedoes/wildsbokke.
Hierdie produk is bedoel vir die behandeling van diere met swaar bosluisbesmetting of beskadiging wat nie maklik met konvensionele metodes b.v. dip, sproeï of opgiel behandel kan word nie.
Dit is nie vir algemene, gereelde behandeling aanbeveel nie.



Verpakking beskikbaar:
100 x balletjies

Onttrekkingsperiode - Vleis: 90 dae.
Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

65 kg - 125 kg = 1 balletjie; 125 kg - 250 kg = 2 balletjies

AFRIVET® 10 % REDLINE ACARICIDAL BALLS



UITWENDIGE PARASIETMIDDEL - BOSLUISDODENDE BALLETTJIES

Flumetrien 10 % m/v

RSA Reg. No.: G4229 (Wet 36/1947)



Vir die beheer van bosluise op koedoes/wildsbokke.
Hierdie produk is bedoel vir die behandeling van diere met swaar bosluisbesmetting of beskadiging wat nie maklik met konvensionele metodes b.v. dip, sproeï of opgiel behandel kan word nie.
Dit is nie vir algemene, gereelde behandeling aanbeveel nie.



Verpakking beskikbaar:
100 x balletjies

Onttrekkingsperiode - Vleis: 90 dae.
Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

125 kg - 250 kg = 1 balletjie; 250 kg - 500 kg = 2 balletjies

AFRIVET® REDLINE POUR-ON



UITWENDIGE PARASIETMIDDEL - OPGIEL

Flumetrien 1 % m/v

RSA Reg. No.: G4245 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: [NSO] V04/18.3.3/538
Botswana Reg. No.: W1301246



Beheer bosluise op beeste, skape, volstruise en wild.
Beheer Tsetsevliegplae by beeste.
Beheer veermyte op volstruise.
Steriliseer wyfiesbosluise.
Maklike toediening.
Nawerking.
Nie-sistemiese aksie.
Die produk is reënvas.



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

1 ml / 10 kg 1 ml / 10 kg 1 ml / 10 kg 1 ml / 10 kg

DELTAPOR® 5

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - OPGIET

Deltametriën 0,5 m/v; piperonielbutoksied 2,5 m/v



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L



RSA Reg. No.: G4252 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V04/18.3.3/539
Botswana Reg. No.: W1301250

Gereed-vir-gebruik opgietsmiddel vir beeste, skape en bokke.
Nawerkende effek.

'n Nie-sistemiese werking.

Beeste: Beheer bosluise, stalvlieë, horingvlieë,
beesluisvlieë en lasvlieë bv. huisvlieë.
Dood luise (bytende en suigende).

Beskerm teen riviernuggies.

Skape en bokke: Beheer Karoooverlamming-,
bontpoot- en rooipootbosluise.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 1 ml / 10 kg  1 ml / 5 kg

DELTAPOR® 10 PLUS

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - OPGIET

Deltametriën 1 m/v; piperonielbutoksied 3 m/v



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1 L, 5 L, 20 L



RSA Reg. No.: G4255 (Wet 36/1947)

Opgietsmiddel vir die beheer van bosluise asook
las-, bytende- en tsetsevlieë op beeste.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 14 dae.
Melk: 48 uur.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 1 ml / 10 kg

TIXAGON® 2%

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - OPGIET

Amitras 2 m/v



Verpakking beskikbaar:
200 ml



RSA Reg. No.: G3575 (Wet 36/1947)

Gereed-vir-gebruik opgietsmiddel vir die beheer
van die geel hondebosluise.
Slegs vir gebruik op honde wat meer as 8 kg weeg.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 2 ml / 10 kg

ERADITICK® CATTLE POUR-ON

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - OPGIET

Amitras 2 % m/v



Verpakking beskikbaar:
20 L



RSA Reg. No.: G4254 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V04/18.3.4/540
Botswana Reg. No.: W1301249

Gereed-vir-gebruik opgietsmiddel vir die
beheer van bosluise op beeste.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.
Melk: 2 dae.

Registrieshouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 1 ml / 10 kg

ERADITICK® PIG POUR-ON

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - OPGIET

Amitras 2 % m/v



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1 L, 5 L



RSA Reg. No.: G4253 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V03/18.3.4/724

Gereed-om-te-gebruik emulsifiseerbare konsentraat
Dood skurftemyte en luise op varke.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrieshouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 12,5 ml / 50 kg

ERADITICK® PLUS POUR-ON

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - OPGIET

Amitras 1,5 % m/v; deltametriën 0,5 % m/v; piperonielbutoksied 3 % m/v



Verpakking beskikbaar:
1 L, 5 L, 20 L



RSA Reg. No.: G4251 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V04/18.3.9/541

Gereed-vir-gebruik opgietsmiddel vir beeste, skape en bokke.

Nawerkende effek. 'n Nie-sistemiese werking.

Beeste: Maklike toediening langs die ruglyn. Beheer bosluise, stalvlieë, horing-, beesluis- en lasvlieë bv. huisvlieë, dood luise (bytende en suigende) en skurftemyte, beskerm teen riviernuggles.

Skape en bokke: Beheer Karooverlammings-, bontpoot- en rooipootbosluise.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.
Melk: Nul.

Registrieshouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 1 ml / 10 kg  1 ml / 5 kg

ERADITICK® 125

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - DOMPEL & SPUIT

Amitras 12.5 % m/v



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L



RSA Reg. No.: G3583 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V10/18.3.4/1147
Botswana Reg. No.: W1301247

Beeste: Beheer bosluise. Dood luise en skurfte myte.
Skape en bokke: Beheer bosluise en skaapbrandsiekte.
Dood jeukmyte en bokskurfte myte.

Beeste: Bespuiting: 1 L / 500 L water. Versterk met 100 ml / 100 diere na 400 diere bespuit is.
Dompeldip (kalk gestabiliseer): 1 L / 2500 L water.
Varsvul (kalk aanvulling): 1 L / 500 L water.
Skape en bokke: Dompeldip (varsvul): 1 L / 375 L water.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien produk voubiljet vir volledige gebruiksaanwysings.

ERADITICK® 250

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - DOMPEL & SPUIT

Amitras 25 % m/v



**DUBBEL
GEKONSENTEER**

Verpakking beskikbaar:
500 ml, 1 L, 5 L, 10 L



RSA Reg. No.: G4047 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V10/18.3.4/1148

Beeste: Beheer bosluise. Dood luise en skurfte myte.
Skape en bokke: Beheer bosluise en skaapbrandsiekte.
Dood jeukmyte en bokskurfte myte.

Beeste: Sproeidip: 1 L / 1000 L water. Versterk met 100 ml / 200 diere na 400 diere bespuit is.
Dompeldip (volledige aanvulling): 1 L / 5000 L water.
Varsvul (kalk aanvulling): 1 L / 1000 L water.
Skape en bokke: Dompeldip (varsvul): 1 L / 750 L water.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien produk voubiljet vir volledige gebruiksaanwysings.

ERADITICK® ULTRA

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - DOMPEL & SPUIT

Chlorfenvinfos 20 % m/v; simiasol 16 % m/v; sipermectrien 2.5 % m/v



Verpakking beskikbaar:
5 L, 10 L



RSA Reg. No.: G3976 (Wet 36/1947)

Emulsifiseerbare konsentraat bees dip en sproei.
Beheer bosluise op beeste; Blou-, bont-,
bontpoot-, rooipoot- en bruinoorbosluise.
Beheer huisvlieë.

Dompeldip: 1 L / 600 L water.
Spuitgang: 1 L / 600 L water.
Handspuit: 10 ml / 6 L water.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 10 dae.
Meik: 12 uur.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

ERADITICK® GREASE

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - GHRIES

Deltamethrien 0,1 % m/v; piperonielbutoksied 0,05 % m/v



Verpakking beskikbaar:
500 g, 4 kg



RSA Reg. No.: G3667 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSOV05/18.3.3/406
Botswana Reg. No.: W1301248

Kolbehandeling vir die beheer van bosluise op
die plek van toediening op beeste en skape.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07



Wend direk met kwas op bosluisvoedingsplekke aan.

DELTA FORCE 100

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - DOMPEL & SPUIT

Deltamethrien 10 % m/v



Verpakking beskikbaar:
100 ml, 1 L, 5 L



RSA Reg. No.: G4367 (Wet 36/1947)

Bees dompel- en sproeidip.
Beheer alle bosluisspesies, bloubosluise inklusie.
Beheer las- en bytende vlieë op beeste,
nl. stalvlieë, huisvlieë, beesluisvlieë,
rivierruggies en horingvlieë.
Beheer spykerwurmbesmettings en tsetsevlieë.

Bespuiging: 1 L / 2000 L water.
Dompeldip: 1 L / 2666 L water.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 21 dae.
Melk: 24 uur.

Registrasiehouer:

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

EXPEL PLUS JETTING FLUID

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - DOMPEL & SPUIT

Ivermektiin 3 % m/v; novaluron 2 % m/v



Verpakking beskikbaar:
5 L



RSA Reg. No.: G4027 (Wet 36/1947)

Dood rooiluise op skape en bokke.
Dood brommer maaiers op skape.
Dood skaapbrandsiektemyte.
Voorkom brommer aanvalle vir tot 16 weke.

Skaapbrandsiekte: Twee behandelings met 'n interval van 7-10 dae as 'n dompeldip.

Skaap en bokke: Dompeldip (varsul): 1 L / 1000 L water.

Dompeldip (aanvulling): 1 L / 1000 L water.

Bespuiging: 1 ml / 1 L water.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 70 dae.
Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

ECOBASH

UITWENDIGE PARASITMIDDEL - DOMPEL & SPUIT

Simiasol 17.5 % m/v; sipermectrien 2.5 % m/v



Verpakking beskikbaar:
1 L, 5 L, 20 L



RSA Reg. No.: G3382 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSQ V04/18.3.9/535

Emulsifiseerbare konsentraat bees-dompel- en sproeidip.
Beheer bosluise, laat bosluise afval. Dood luise.
Beheer lasvlieë – bytende- en gesigvlieë.
Beskerm teen spykerwurm besmetting in beeste.

Dompeldip (varsul): 1.5 L / 1000 L water).
Dompeldip (aanvulling): 3 L / 1000 L water).
Sputgang: 1.5 L / 1000 L water.
Handspuit: 15 ml / 10 L water.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.
Melk: Nul.

Registrieshouer:
ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.1992/000835/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

ECOFLUKE

INWENDIGE PARASITMIDDEL - DOSEER

Triklabendasool 10 % m/v

Ⓢ†



Verpakking beskikbaar:
5 L



RSA Reg. No.: G3383 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSQ V04/18.1.1/537

Lewerslakmiddel teen onvolwasse en volwasse lewerslak
en reuse lewerslak in beeste, skape en bokke.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 28 dae.
Melk: 14 dae.

Registrieshouer:
ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.1992/000835/07

12 ml / 100 kg 1 ml / 10 kg

ECOTEL 2.5 %

INWENDIGE PARASITMIDDEL - DOSEER

Prasikwantel 2.5 % m/v

Ⓢ†



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1 L, 5 L



RSA Reg. No.: G3162 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSQ V03/18.1/303

Orale, vloeibare lintwormmiddel teen dunderm en
liewerlintworm in skape, en lintworm in beeste en volstruise.

Skaap dosis: Melk lintworm : 2 ml / 10 kg
Geriffelde lintworm: 2 ml / 10 kg
Dunlintworm: 3 ml / 10 kg
Lewerlintworm: 4 ml / 10 kg

Volstruis dosis: Volstruislintworm 3 ml / 10 kg

Bees dosis: Melklintworm 2 ml / 10 kg

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrieshouer:
ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.1992/000835/07

2 ml / 10 kg 2 - 4 ml / 10 kg 3 ml / 10 kg

ERADIWORM® CONCENTRATE

INWENDIGE PARASIE TMIDDEL - DOSEER

Levamisool hidrochloried 25 % m/v

③†



Verpakking beskikbaar:
500 ml



RSA Reg. No.: G4250 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V04/148.1.4/298

Rondewurmmiddel vir beeste, skape, bokke en volstruise.
Vlek nie wol of bokhaar nie.
Verdun voor gebruik - 500 ml met 4.5 L water.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 days

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 15 ml / 50 kg  3 ml / 10 kg  12 ml / 10 kg

ERADIWORM® 25

INWENDIGE PARASIE TMIDDEL - DOSEER

Levamisool hidrochloried 2,5 % m/v

③†



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1 L



RSA Reg. No.: G4249 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V02/18.1.4/301

Rondewurmmiddel vir beeste, skape, bokke en volstruise.
Vlek nie wol of bokhaar nie.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 15 ml / 50 kg  3 ml / 10 kg  12 ml / 10 kg

ERADIWORM® TAPE

INWENDIGE PARASIE TMIDDEL - DOSEER

Levamisool hidrochloried 37,5 mg/ml; prasikwantel 18,8 mg/ml

③† ③†



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1 L, 5 L, 10 L



RSA Reg. No.: G4244 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V04/18.1.8/542

Rondewurm en lintwurm behandeling vir
skape, bokke, beeste en volstruise.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 10 ml / 50 kg  2 ml / 10 kg  1 ml / 1 kg

ERADIWORM® PLUS

INWENDIGE PARASITMIDDEL - DOSEER

Levamisool 3 % m/v; rafoksanied 3 % m/v

③† ④†



Verpakking beskikbaar:
500 ml, 1 L, 5 L, 10 L



RSA Reg. No.: G4265 (Wet 36/1947)

'n Middel teen rondewurms en lewerslakke in skape, bokke en beeste en neusvlieg larwes in skape en bokke.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 28 dae.

Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:

Burke Animal Health (Edms) Bpk, Mpy. Reg. No.: 1996/00721/07

 12.5 ml / 50 kg  2.5 ml / 10 kg

ECOMINTIC 50

INWENDIGE PARASITMIDDEL - DOSEER

Fenbendasool 5 % m/v

②†



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1 L, 5 L, 10 L



RSA Reg. No.: G2000 (Wet 36/1947)

Namibië Reg. No.: NSO V02/18.1.1/1146

'n Middel teen rondewurms in beeste, perde en volstruise en rondewurms en melklintwurm in skape en bokke.

***Skape en bokke:**

Rondewurms: 1 ml / 10 kg

Melklintwurm: 2 ml / 10 kg

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrasiehouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy. Reg. No. 1992/000835/07

 1 ml / 10 kg  1 - 2 ml / 10 kg*  3 ml / 10 kg  2 ml / 10 kg

OSTRIDOSE

INWENDIGE PARASITMIDDEL - DOSEER

Fenbendasool 5 % m/v

②†



Verpakking beskikbaar:
10 L



RSA Reg. No.: G2243 (Wet 36/1947)

Namibië Reg. No.: NSO V01/18.1.1/312

Rondewurmmiddel vir volstruise en perde.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.

Registrasiehouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy. Reg. No. 1992/000835/07

 3 ml / 10 kg  2 ml / 10 kg

MOXZIBEN

INWENDIGE PARASITMIDDEL - DOSEER

Triklabendasool 5 % m/v; prazikwanteel 3,75 % m/v; maksisektrien 0,1 % m/v

②† ⑧† ⑩†



Gereed-vir-gebruik orale ontwormingsmiddel vir skape vir die beheer van rondewurms, insluitend haarwurm, bruinmaagwurm, bankrotwurm, langnekbankrotwurm en grootbekwurm asook lewerslak, reuse lewerslak en melkintwurm. Beheer neuswurm larwe infestasie.

Nawerking: Haarwurm en bruinmaagwurm vir 28 dae.

Verpakking beskikbaar:
5 L, 10 L

Onttrekkingsperiode - Vleis: 10 dae.
Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

 1 ml / 5 kg

CLOSECO 7.5 %

INWENDIGE PARASITMIDDEL - INSPUITBAAR

Klosanteel 7.5 % m/v

④†



Beeste: Lewerslak en rondewurmmiddel met nawerking teen herbesmetting met haarwurm, haakwurm en knoppieswurm.

Skape: Beheer haarwurm vir 21 dae, neuswurm larwes en haakwurm. Help met die beheer van haarwurm vir 35 dae. Beheer volwasse lewerslak en help met die beheer van onvolwasse lewerslak.

Toediening (Skape): SK
Toediening (Beeste): SK / IM
Onttrekkingsperiode - Vleis: 30 dae.
Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:
ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No. 1992/000835/07

Verpakking beskikbaar:
500 ml

 1 ml / 30 kg (normale dosis) - 1 ml / 15 kg (dubbel dosis)  1 ml / 15 kg

ECOMECTIN 1 %

INWENDIGE & UITWENDIGE PARASITMIDDEL - INSPUITBAAR

Ivermektrien 1 % m/v

⑩†



Behandeling van rondewurms in skape en beeste en valskneusing en oogwurm in beeste. Dood suigende luise, skurfteymte, spykerwurm, en beheer bloubosluise en sandtampans op beeste. Dood skaapbrandsiekteymte, beheer Australiese jeukmyte en neuswurm (alle stadia) by skape. Dood skurfteymte op varke.

Toediening: SK.
Onttrekkingsperiode - Vleis (beeste en skape): 21 dae.
Vleis (varke): 28 dae.
Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:
ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No. 1992/000835/07

Verpakking beskikbaar:
20 ml, 50 ml, 500 ml, 1 L

 1 ml / 50 kg  1 ml / 50 kg  1 ml / 33 kg

ECOMECTIN PIG PREMIX



RSA Reg. No.: G3860 (Wet 36/1947)

INWENDIGE & UITWENDIGE PARASIETMIDDEL - POEIER

Ivermektien 0.6 % m/v

⊕†



Antiparasitiese middel vir varke vir die behandeling en beheer van gastroïntestinale rondewurms, longwurms, luisse en myte in volwasse en groeiende varke.

Behandel vir 7 opeenvolgende dae.

Varke < 40 kg: 333 g per 1 ton voltooide voer.

Varke tussen 40-100 kg: 400 g per 1 ton voltooide voer.

Volwasse varke: 1.67 kg per 1 ton voltooide voer.

Onttrekkingsperiode - Vleis: >100 kg: 12 dae na laaste behandeling.
<100 kg: 3 dae na laaste behandeling.

Registrieshouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.1992/000835/07

Verpakking beskikbaar:
5 kg

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

ECOMECTIN SHEEP DRENCH



RSA Reg. No.: G2630 (Wet 36/1947)

Namibië Reg. No.: NSO V99/18.1.2/305

INWENDIGE & UITWENDIGE PARASIETMIDDEL - DOSEER

Ivermektien 0.08 % m/v

⊕†



'n Middel teen rondewurms en neusvlieg-larwes in skape en bokke en jeukmyt in skape.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 14 dae.

Melk: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrieshouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.1992/000835/07

Verpakking beskikbaar:
1 L, 5 L

2,5 ml / 10 kg



VIT-AID

VITAMIEËNE / MINERALE - INSPUITBAAR

Vitamiën A 500 000 IE; vitamien E 50 IE



Verpakking beskikbaar:
100 ml



RSA Reg. No.: G0678 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSQ V02/19.1/472

VIT-AID vitamien A inspuiting is 'n water gebaseerde oplossing van vitamien A, vir die voorkoming en behandeling van vitamien A tekort in beeste.

Toediening: IM.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.

Meik: Nul.

Registrasiehouer:

Formulation Technologies CC, Mpy. Reg. No.: CK90/19937/23.

 1 ml / 250 kg

OVI-MIN® GEL

VITAMIEËNE / MINERALE - ORALE DOSERING

Vitamiën A 50 000 IE; vitamien D₃ 2 500 IE; vitamien E 500 IE; mangaan 200 mg; sink 600 mg; selenium 20 mg; magnesium 1 000 mg; kobalt 15 mg; lisien 2 000 mg



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1 L, 5 L, 25 L



RSA Reg. No.: V24722 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: N-FF2897

Vitamiën, mineraal en aminosuur aanvulling vir skape en bokke.

OVI-MIN® GEL voorsien essensiële organiese spoorelemente, magnesium, aminosure en vetoplosbare vitamieëne om vrugbaarheid, immuniteit en groei te ondersteun in skape en bokke.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.

Meik: Nul.

Registrasiehouer:

Camelus Grandstowwe CC, Mpy. Reg. No.: 1996/41164/23

 Lammers: 5 ml / 12 kg; speentyd: 10 ml / 25 kg;
volwasse ooie: 25 ml / 65 kg; volwasse ramme: 45 ml / 100 - 120 kg.

OVI-MIN® + CU GEL

VITAMIEËNE / MINERALE - ORALE DOSERING

Inhoud per 100 ml: Vitamiën A 50 000 IE; vitamien D₃ 2500 IE; vitamien E 500 IE; mangaan 200 mg; sink 600 mg; selenium 20 mg; magnesium 1 000 mg; kobalt 15 mg; lisien 2 000 mg; koper 100 mg



Verpakking beskikbaar:
1 L, 5 L, 25 L



RSA Reg. No.: V26349 (Wet 36/1947)

Vitamiën, mineraal en aminosuur aanvulling vir skaap en bokke.
OVI-MIN® + CU GEL voorsien noodsaaklike organiese spoorelemente, magnesium, aminosure en vetoplosbare vitamieëne om vrugbaarheid, immuniteit en groei in skape en bokke te ondersteun.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.

Meik: Nul.

Registrasiehouer:

Camelus Grandstowwe CC, Mpy. Reg. No.: 1996/41164/23

 Lammers: 5 ml / 12 kg; speentyd: 10 ml / 25 kg;
volwasse ooie: 25 ml / 65 kg; volwasse ramme: 45 ml / 100 - 120 kg.

BOVI-MIN® GEL

VITAMIEËNE / MINERALE - ORALE DOSERING

Inhoud per 100 ml: Vitamien A 100 000 IE; vitamien E 100 IE; koper 180 mg; mangaan 340 mg; en in organiese verbindings, selenium 20 mg; sink 680 mg; magnesium 1 000 mg; kobalt 5 mg; lisien 2 000 mg



Verpakking beskikbaar:
1 L, 5 L, 25 L

Vitamiën, mineraal en aminosuur aanvulling vir beeste.
BOVI-MIN® GEL voorsien noodsaaklike organiese spoorelemente, magnesium, aminosure en vetoplosbare vitamieë om vrugbaarheid, immuniteit en groei in vleisbeeste te ondersteun.



RSA Reg. No.: V24721 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: N-FF2896

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Meik: Nul.

Registrasiehouer:

Camelus Grandstowwe CC, Mpy. Reg. No.: 1996/41164/23.



Kalwers: 10 - 20 ml / 80 - 150 kg;
koeie: 60 ml / 450 kg; **bulle:** 120 ml / 850 kg.

DAIRY-MIN® GEL

VITAMIEËNE / MINERALE - ORALE DOSERING

Inhoud per 100 ml: Vitamien A 50 000 IE; vitamien E 400 IE; koper 150 mg; mangaan 300 mg; sink 500 mg; magnesium 500 mg; kobalt 5 mg; selenium 20 mg



Verpakking beskikbaar:
5 L, 25 L

Vitamiën, mineraal en aminosuur aanvulling vir melkbeeste.
DAIRY-MIN® GEL voorsien noodsaaklike organiese spoorelemente, magnesium, aminosure en vetoplosbare vitamieë om vrugbaarheid, immuniteit en groei in melkbeeste te ondersteun.



RSA Reg. No.: V24723 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: N-FF2898

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Meik: Nul.

Registrasiehouer:

Camelus Grandstowwe CC, Mpy. Reg. No.: 1996/41164/23



Kalwers: 15 - 20 ml / 50 - 90 kg; **vervangingsverse:** 55 - 60 ml / 250 - 275 kg;
koeie: 100 - 120 ml / 450 - 600 kg; **bulle:** 165 - 200 ml / 750 - 900 kg.

DAIRY-MIN® SUPER

VITAMIEËNE / MINERALE - ORALE DOSERING

Inhoud per 1 L: Vitamien A 85 000 IE; vitamien E 1 200 IE; kobalt 25 mg; koper 750 mg; magnesium 2 500 mg; en in organiese verbindings, mangaan 1 500 mg; selenium 100 mg; sink 2 500 mg; fulviensuur 780 000 mg



Verpakking beskikbaar:
5 L, 25 L

Vitamiën- en mineraalaanvulling vir melkbeeste.
DAIRY-MIN® SUPER voorsien noodsaaklike organiese spoorminerale uit glisinaat- en proteïenaatkomplekse met magnesium en vetoplosbare vitamieë, versterk met fulviensuur om die immuunstelsel, vrugbaarheid, groei en om melk-kwaliteit te ondersteun deur gunstige somatiese seltellings.



RSA Reg. No.: V31994 (Wet 36/1947)

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Meik: Nul.

Registrasiehouer:

Camelus Grandstowwe CC, Mpy. Reg. No.: 1996/41164/23



0.5 ml / kg vir 3 agtereenvolgende dae

ELECTRO GUARD® NF GEL



VITAMIEËNE / MINERALE - ORALE DOSERING

Inhoud per 100 ml: Ascorbiensuur 500 mg; biotine 3 mg; kalsium 600 mg; foliensuur 23 mg; magnesium 230 mg; metaboliseerbare energie (dektrose) 250 KJ; vog 800 mg; niasien 350 mg; pantoteensuur (kalsiumpantotenaat) 105 mg; kaliumchloried 950 mg; piridoksien (vitamien B₆) 90 mg; riboflavin (vitamien B₂) 70 mg; natriumchloried 1 300 mg; tiamien (vitamien B₁) 44 mg; vitamien A 110 000 IE; vitamien B₁₂ 0,44 mg; vitamien D₃ 30 000 IE; vitamien E 525 IE; vitamien K₃ 35 mg



Verpakking beskikbaar:
200 ml, 1L, 5 L, 25 L

RSA Reg. No.: V28622 (Wet 36/1947)

Vitamien-, mineraal- en aminosuuraanvulling vir herkouters, wild, volstruise, varke en perde. Water oplosbare gel vir die voorkoming en ondersteuning van simptome geassosieer met stres, as gevolg van voerweiering, grootpens- en ingewandstase, ontwatering, maagwerkings, aanpassingsprobleme, afwykende gedrag en siekte in wild, herkouters, volstruise, varke en perde.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:

Camelus Grandstowwe CC, Mpy. Reg. No.: 1996/41164/23.

Orale behandeling: 3 - 4 ml / 10 kg, onverdund vir 1 - 3 dae soos nodig;
watertoediening: 3 - 4 ml / liter drinkwater vir 3 - 5 dae soos nodig.

CALCIMAX® RTU



VITAMIEËNE / MINERALE - ORALE DOSERING

Elke liter bevat: Kalsium 80 g; magnesium 7 g; propileen glikol en monosakkariedes 250 g; vitamien D₃ 20 000 IE



Verpakking beskikbaar:
500 ml

RSA Reg. No.: V32091 (Wet 36/1947)

CALCIMAX® RTU is 'n gereed-vir-gebruik kombinasie van kalsium, magnesium en vitamien D₃ in 'n energie-gebaseerde kombinasie vanaf propileenglikol en monosakkariedes om te help met kalsium, magnesium en energie tekorte na beeste kalf, skape / bokke lam, varke kraam en perde vul. Kalsium bronne is 'n unieke kombinasie van vinnig-, gematig- en stadig-vrystellende bronne.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:

Camelus Grandstowwe CC, Mpy. Reg. No.: 1996/41164/23

1 ml / kg liggaamsmassa



AFRI-VIT P

VITAMIEËNE / MINERALE - POEIER

Samestelling per kg: Vitamien A-asetaat 40 g; vitamien D₃ 1 g; vitamien E 50 % 28 g; vitamien B₁ 5 g; vitamien B₂ 6 g; vitamien B₆ 1,28 g; vitamien B₁₂ 20 g; vitamien C 45 g; vitamien K₁ 2,22 g; vitamien B₈ 3,6 g; kalsium D-pantotenaat 2,55 g; argien 24 g; glisin 35 g; lisen 24,74 g; melionien 26,4 g; threonien 12 g; triptofaan 4,9 g; natriumbensoaat 5 g; natrium 16,08 g; chloried 24,56 g; deksrose 675,76 g; droëe anaksitol 10 g; prosesseermiddel 5 g



Verpakking beskikbaar:
100 g, 1 kg, 5 kg

Vitamien en aminosuur aanvulling vir pluimvee, varke en kalwers.

Afri-Vit P bevat al die nodige voedingstowwe om die herstelproses na siekte te help bespoedig.



RSA Reg. No.: V28852 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: N-FF4717

Onttrekingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.
Eiers: Nul.

Registrasiehouer:
Afri-Vit Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

0,5 g - 1 g per liter drinkwater vir ten minste 3 - 5 dae

AFRI-VIT STRESS

VITAMIEËNE / ELEKTROLIETE - POEIER

Samestelling per kg: Betaïne 200 000 mg; vitamien C 180 000 mg; natriumchloried 150 000 mg; vitamien A 15 000 000 IE; vitamien E 25 000 mg; vitamien D₃ 2 000 000 IE; pantoteensuur 10 000 mg; kaliumchloried 10 000 mg; vitamien B₁ 5 000 mg; vitamien K 4 000 mg; niasien 2 500 mg; vitamien B₂ 2 000 mg; foliensuur 500 mg; biotien 40 mg; vitamien B₆ 20 mg



Verpakking beskikbaar:
100 g



AFRI-VIT STRESS bevat betaïne. Dit is 'n gekonsentreerde wateroplosbare elektroliet en kan by voer of water gevoeg word tydens periodes van erge hitte. Betaïne help om metabolisme funksies te handhaaf of as selle onder verskillende tipes osmolariese druk verkeer soos hittestres.



RSA Reg. No.: V31551 (Wet 36/1947)

Registrasiehouer:

Afri-Vit Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien produk voubiljet vir volledige gebruiksaanwysings.

FIBREMAX

VITAMIEËNE / MINERALE - VOERBYVOEGSEL

Samestelling per 100 ml: Poliëtiëleenglikol (PEG) en polivinilpirolidon (PVP) 30 000 mg; propiëleenglikol en alkaliserende buffermiddels 22 000 mg



Verpakking beskikbaar:
1 L, 5 L



RSA Reg. No.: V26352 (Wet 36/1947)

'n Wateroplosbare middel met anti-tanniene & terpiene inhibeerder, versterk deur die ondersteuning van energie en buffers. Dit beperk die verterings- en gesondheidsbeperkings wat gepaard gaan met tannien en terpienryke blare vreet, swak kwaliteit weiding in droë toestande en in die winter.

FIBREMAX ondersteun diere se gesondheid deur meer effektiewe verbruik van die plantmateriaal wat beskikbaar is.

Onttrekingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:
Camelus Grandstowwe CC, Mpy, Reg. No.: 1996/41164/23

200 ml per 1000 L drinkwater

CHLORTET FG 200

VOERBYVOEGSEL - TETRASIKLIE

Chloortetrasiklien 200 g / kg (as die stabiele chloortetrasiklien kalsium kompleks)



Verpakking beskikbaar:
25 kg



RSA Reg. No.: G3141 (Wet 36/1947)

Vir die behandeling van respiratoriese-en ander infeksies veroorsaak deur organismes vatbaar vir chloortetrasiklien in pluimvee insluitend kalkoene, varke, kalwers en voerkrasvee. Nie vir lêhennetjies of teëlhoenders nie.

Pluimvee insluitend kalkoene, varke, beeste en kalwers:
1,5 - 2 kg per ton voer vir 5 - 7 dae.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 7 dae.
Melk: Nul.

Eiers: Nie vir menslike gebruik nie.

Registrasiehouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 1992/000835/07

Presiese insluitingskoers moet deur 'n veearts bepaal word.

TYLECO FG 100

VOERBYVOEGSEL - MAKROLIEDE ANTIBIOTIKA

Tilosien fosfaat 10 % m/m



Verpakking beskikbaar:
25 kg



RSA Reg. No.: G2152 (Wet 36/1947)

'n Hulpmiddel vir die verbetering van groeitempo en/of voer omsettingsdoeltreffendheid by varke, vleisbeeste, en braaikuikens asook voer effektiwiteit en eierproduksie in lêhoenders.

Onttrekkingsperiode - Vleis (varke): 15 dae.
Vleis (braaikuikens): 3 dae.

Registrasiehouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 1992/000835/07

Sien produk voubiljet vir volledige gebruiksaanwysings.



AIVLOSIN® WATER SOLUBLE POWDER

VOERBYVOEGSEL - MAKROLIEDE ANTIBIOTIKA

Elke gram bevat 625 mg Tylvalosien (as Tylvalosienfartraal) as aktiewe bestanddeel



RSA Reg. No.: G1598 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: NSO V02/17.1.4/1144



Hulpmiddel vir die voorkoming van mikoplasmose in
braaikuikens en vervangingslêhenetjies.

Voorkomend: 1 x 40 g sakkie Aivlosin by 2 L warm water en meng met 200 L drinkwater.

Behandeling: 1 x 40 g sakkie Aivlosin by 2 L warm water en meng met 100 L drinkwater.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 5 dae.

Eiers: Nul.

Registrasiehouer:

ECO Animal Health Southern-Africa (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 1992/000835/07

Verpakking beskikbaar:

40 g sakkie. Elke sakkie bevat 25 g Tylvalosin.

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.



SALMONELLA PVI VACCINE



ENTSTOF - INSPUITBAAR

Gespesifiseerde Salmonella spesies met *S. typhimurium* $\geq 2.5 \times 10^8$ KVE; *S. enteritidis* $\geq 2.5 \times 10^8$ KVE; *S. gallinarum* $\geq 2.5 \times 10^8$ KVE voor inaktivering en 'n olie adjuvant

RSA Reg. No.: G4405 (Wet 36/1947)



Vir die gebruik in kommersiële en teelhoenders vir immuniteit teen salmonellose in pluimvee. Gebruik as voor- en midlê entstof.

Verpakking beskikbaar:
500 ml

Salmonella is 'n beheerde siekte volgens die Dieresiekte wet (Wet 35/1984). Volgens wet moet enige gevalle van Salmonella of vermoedelike gevalle aan die plaaslike Staatsveterinêr rapporteer word.

Onttrekkingsperiode - Vleis: 21 dae.
Eiers: Moenie lê- en teelhoenders binne 4-6 weke voor en na lê inent nie.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk. Mpy. Reg. No.: 2000/011263/07

Sien produk voubiljet vir volledige gebruiksaanwysings.

WIREVAX



ENTSTOF - INSPUITBAAR

Haemonchus contortus antigeen 5 µg / ml

RSA Reg. No.: G4200 (Wet 36/1947)



'n Entstof wat help met die beheer van haarwurmbesmetting in skape.

Verpakking beskikbaar:
250 ml

Toediening: SK.
Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk. Mpy. Reg. 2000/011263/07

Sien produk voubiljet vir volledige gebruiksaanwysings.

WEES DEEL VAN DIE

WIREVAX
Reg. No. G4200 (Wet 36/1947)
REVOLUSIE

1^{STE} ENTSTOF TEEN HAARWURM IN SUID-AFRIKA

BETAMINT

HITTESTRES OPLOSSING - ORAAL

Elke liter bevat: Betaine 250 g; vitamien C 90 g; kaliumchloried 2 g; magnesiumchloried heksahidraat 4 g; kalsiumchloried 40 g; natriumchloried 20 g



RSA Reg. No.: V28610 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: N-FF4716



Orale oplossing vir die her-hidrasie van varke en pluimvee wat aan hitte-stres ly as gevolg van hoë omgewings-temperatuur en hoë vogtigheid.
Bevat betaine, 'n osmooliet wat die selle help om water te behou.
Kan voor, gedurende of na die aanvang van hitte stres gebruik word.

Voorkoming: 1 ml per 1 L water vir 3 - 5 dae OF 1 L per 1000 L water vir 3 - 5 dae.

Beheer: 2 ml per 1 L water vir 3 - 5 dae OF 2 L per 1000 L water vir 3 - 5 dae.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.

Melk: Nul.

Registrasiehouer:

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy. Reg. No.: 2000/011263/07

Verpakking beskikbaar:
1 L

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.



MISTIFLY® GREEN



VLIEGBEHEER - POEIER

VEEARTSENYKUNDIGE KOMPLEMENTÊRE MEDISYNE
28.9 kombinasie produk: medium ketting vetsure



Gereed-om-te-gebruik poeierstof, vir die afweer van stalvlieë, huisvlieë, horingvlieë, muskiete en muggies.

Verpakking beskikbaar:
2 x 3.6 kg sakke per emmer

Hierdie medisyne is nie geëvalueer deur die Medisynebeheerraad nie. Hierdie medisyne is nie bedoel om te diagnoseer, te behandel, genees of enige siekte te voorkom nie.

Onttrekkingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien produk voubiljet vir volledige gebruiksaanwysings.

ERADIFLY® GRANULAR

VLIEGBEHEER - KORRELS

Novaluron 0.2 % (Insek groeireguleerder)



Verpakking beskikbaar:
5 kg, 25 kg

RSA Reg. No.: L10328 (Wet 36/1947)

Beheer vliegirritasie tot en met 54 dae.
Bevat 'n insekgroeireguleerder.
Breek die vlieglewenssiklus.
Voorkom ontwikkeling
van larf na volwasse vlieg.
Korrels vir maklike toediening op mishope.

Toediening: Dien toe teen 26 g / m².
Dien direk toe op vliegbroeiplekke rondom hooibale, melkskure,
veevoerkrale en alle ander areas waar vlieë kan broei.

Registrasiehouer:

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

ICON® 10 CS

INSEKBEHEER - SPROEI

Lambda-cyhalothrin 100 g / L



RSA Reg. No.: L7860 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: N-AR 0814.

Beheer 'n wye reeks kruipende en vlieënde insekte
bv vlieë, kewers, muskiete, kakkerlakke en miere.
Baie lae dosis wat benodig word om insekte te dood
met 'n lang nawerking van minimum 4 weke.
Water basis en sal nie vlek nie.
Mikro-gekapsoleerde formulاسie.

Muskiete en malaria vektor beheer (binnenshuise residusproei): 62.5 ml / 10 L water.
Peste: 75 ml / 10 L water.

Registrasiehouer:

Syngenta South Africa (Edms) Bpk Mpy, Reg. No.: 1998/013761/07.

Verpakking beskikbaar:
1 L

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

EXPTEL WOUND OIL

WONDBEHANDELING - OLIE

Gom en olie 99,39 % m/m; kiemdoder 0,51 % m/m; dellametrien 0,1 % m/m



Verpakking beskikbaar:
100 ml



RSA Reg. No.: G3245 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: [NSO] V04.18.3.3/482
Botswana Reg. No.: W130581

Spykerwurm- en wondmiddel.
'n Veeldoelige middel vir doeltreffende beheer en voorkoming van spykerwurm/brommer-maaiër aanvalle, bevorder genesing en dood bosluise teenwoordig tydens aanwending.
Moenie op katte gebruik nie.

Toediening: Wend aan in, om en op wonde, vir voorkoming van spykerwurm/brommer- maaiër aanvalle, verlaag bakteriese infeksie en bevorder genesing.
Behandeling vir spykerwurm/brommer-maaiër aanvalle:
Dien behandeling toe ± elke 4 dae totdat dit genees is.

Onttrekingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

EXPTEL WOUND SPRAY

WONDBEHANDELING - SPUIT

Gom en olie 99,39 % m/m; kiemdoder 0,51 % m/m; dellametrien 0,1 % m/m



Verpakking beskikbaar:
300 ml



RSA Reg. No.: G3245 (Wet 36/1947)
Namibië Reg. No.: [NSO] V04.18.3.3/482
Botswana Reg. No.: W130581

Spykerwurm- en wondmiddel.
'n Veeldoelige middel vir doeltreffende beheer en voorkoming van spykerwurm/brommer-maaiër aanvalle, bevorder genesing en dood bosluise teenwoordig tydens aanwending.
Moenie op katte gebruik nie.

Toediening: Wend aan in, om en op wonde, vir voorkoming van spykerwurm/brommer- maaiër aanvalle, verlaag bakteriese infeksie en bevorder genesing.
Behandeling vir spykerwurm/brommer-maaiër aanvalle:
Dien behandeling toe ± elke 4 dae totdat dit genees is.

Onttrekingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:
Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

FUTASPRAY

WONDBEHANDELING - SPUIT

Chloorheksidienglukonaat 100 mg; setrimied 1 g; gentiaan violet 500 mg



Verpakking beskikbaar:
400 ml



RSA Reg. No.: G2715 (Wet 36/1947)

Antibakteriële en swamdodende wondsproei met gentiaan violet.
Vir die behandeling van wonde en velinfeksies.

Toediening: Verwyder enige sigbare vullis en maak die wondarea skoon.
Dien FUTASPRAY AEROSOL eweredig oor die hele wondoppervlak toe.
Herhaal daaglik indien nodig.

Onttrekingsperiode - Vleis: Nul.
Melk: Nul.

Registrasiehouer:
Oloff Trust, Mpy, Reg. No.: 1211/85, Mafuta Products

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

STOCKHOLM TAR SPRAY

SEËLMIDDEL - SPUIT

NIE 'N VETERINÊRE MEDISYNE NIE



Verpakking beskikbaar:
250 ml

Gebruik na onthoring, skeer en stertamputasies.
Gebruik op perde se hoewe.
Weer vog af nadat vrugtebome gesnoei is.

Aanwysings: Maak die area deeglik skoon.
Hou die houer regop, spuit die toedieningsarea.



Verspreider:

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

A.C.T. CLEANING FLUID®

ONTSMETTINGSMIDDEL

Teersure KP 180 – 250 °C 16 % m/v; teerolie KP 185 – 310 °C 65 % m/v;
seep (harpui + groente-olies gelykstaande aan 12,5%) 20 % m/v; karbolsuur (RW) koëffisiënt 5



Verpakking beskikbaar:
500 ml, 5 L

Algemene harde oppervlak ontsmettingsmiddel
vir gebruik op plaasgeboue en toerusting.

Algemene ontsmettingsmiddel : 1:250 dilution rate.
Wanneer aansteeklike siektes teenwoordig is : 1:100 dilution rate.

Registrasiehouer:

Chemical Process Technologies (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2001/002516/07

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

A.C.T. LONG ACTING DISINFECTANT

ONTSMETTINGSMIDDEL

Dideseldimetielammoniumchloried 0,2 - 0,3 %; bensiel-C12-16-alkildimetiel 0,2 - 0,3 %;
polihexamilleenbiguanied hidrochloried 0,5 - 0,6 %



Uiters effektiewe en ekonomiese harde oppervlak ontsmettingsmiddel
vir gebruik in veefasiilteite en omgewings.
Biosekuriteitsmiddel om jou diere van ekonomies belangrike
siektes te beskerm, soos bek-en-klousee en Afrika-varkpes.

Reg. No.: NRCS/8054/289982/1189

Aanbeveelde verdunning:

Bek-en-klousee en Afrika-varkpes: 1 ml / 15 ml water
Kontaktyd: 15 minute

Registrasiehouer:

Residual Barrier Technology (Edms) Bpk Mpy, Reg. No.: 2016/499996/07

Verpakking beskikbaar:
150 ml, 1 L, 5 L, 20 L

Sien bo vir volledige gebruiksaanwysings.

TERMOMETER

TOERUSTING



'n Termometer is 'n noodsaaklike instrument in enige boer se noodhulptas. Vroeg oggende is die beste tyd om 'n dier se temperatuur te meet. Die normale temperatuur vir beeste, skape en bokke is 38,5°C.

Gebruiksaanwysings op verpakking ingesluit.

GEWIGSMAATBAND

TOERUSTING



Eenvoudig, ekonomies, prakties en effektiewe manier om gewig te beraam. Dit is belangrik om die gewig van jou diere te weet om die regte dosis medisyne vir jou diere te gee om siektes te voorkom en te behandel.

Tale beskikbaar:

isiZulu en Sesotho.
isiXhosa en Setswana.
Engels en Portugees.

Gebruiksaanwysings op verpakking ingesluit.



KONTAKBESONDERHEDE

KOMMERSIËLE SPAN

Anathi Toki	Bestuurs-assistent	anathi.toki@afrivet.co.za
-------------	--------------------	---------------------------

LEWENDEHAWE

Francois Smit	Streeksbestuurder en Eswatini	francois.smit@afrivet.co.za
Riaan Vermeulen	Streeksbestuurder en Voerkrale	riaan.vermeulen@afrivet.co.za
Ivahn van Niekerk	Streeksbestuurder	ivahn.vanniekerk@afrivet.co.za

VARKE & PLUIMVEE

Blanche de Lange	Besigheideenheid-bestuurder	blanche.delange@afrivet.co.za
------------------	-----------------------------	-------------------------------

TROETELDIERE

Thalita Weitzman	Besigheideenheid-bestuurder	thalita.weitzman@afrivet.co.za
------------------	-----------------------------	--------------------------------

VOERKRALE

Riaan Vermeulen	Streeksbestuurder en Voerkrale	riaan.vermeulen@afrivet.co.za
-----------------	--------------------------------	-------------------------------

UITVOERE

Ratselane Marumo	Uitvoerbestuurder	ratselane.marumo@afrivet.co.za
Cobus Campher	Kommersiële Bestuurder: Botswana	cobus.campher@afrivet.co.za

AFRIVET TRAINING SERVICES

Sipokazi Nyeleka	Koördineerder	operationscoordinator.ats@afrivet.co.za
------------------	---------------	---

TENDER

Vir kwotasies kontak tenders@afrivet.co.za		
--	--	--

INENTINGS- & DOSERINGSPROGRAMME

INENTINGSPROGRAM VIR VLEISBEESTE OP DIE VELD

GROEP:	ENTSTOF / ORGANISME:	TOEDIENING:
Kalwers	Miltsiekte	Speentydouderdorm
	Lamsiekte	Speentydouderdorm (skraagdosis 21 dae later)
	Multi-klostridiale entstof	3 maande tot speenouderdorm. (skraagdosis 21 dae later)
	Knopvelsiekte	Speenouderdorm
	Slenkdalkoors	Speenouderdorm
	Hartwater	0 - 21 dae
	Rooiwater	3 - 9 maande
	Galsiekte	3 - 9 maande
	Hondsolheid (ZeroRab)	Sien produk voubljiet

Verse	<i>Brucella abortus</i> • S19 ◊ RB51	• 4 - 7 maande oud • 3 maande voor eerste dekseisoen
	Respiratoriese kombinasies (BVD, IBR, PI3 en BRSV)	2 maande voor eerste dekseisoen

Bulle	Multi-klostridiale entstof	Jaarlikse skraagdosis
	<i>Vibrio</i>	1 - 2 maande voor dekseisoen
	Lamsiekte	Jaarlikse skraagdosis

Koeie	Multi-klostridiale entstof	Jaarlikse skraagdosis 2 maande voor kalwing begin
	Knopvelsiekte	Jaarlikse skraagdosis in lente
	Miltsiekte	Jaarlikse skraagdosis (Vermag laat dragtigheid)
	Respiratoriese kombinasies (BVD, IBR, PI3 en BRSV)	1 - 2 maande voor dekseisoen
	<i>Brucella abortus</i> (RB51)	Voor dekseisoen (S19 mag nooit herhaal word nie)
	Hondsolheid (ZeroRab)	Sien produk voubljiet

INENTINGSPROGRAM VIR MELKBEESTE

GROEP:	ENTSTOF / ORGANISME:	TOEDIENING:
Kalwers	Hartwater	0 - 21 dae
	Hondsolheid (ZeroRab)	Opsioneel op 3 maande
	Miltsiekte	7 maande
	Lamsiekte	7 maande, skraagdosis 21 dae later
	Multi-klostridiale entstof	3 - 7 maande, skraagdosis 21 dae later
	Rooiwater	3 - 9 maande
	Galsiekte	3 - 9 maande
	Knopvelsiekte	7 maande
	Slenkdalkoors	7 maande

Verse	<i>Brucella abortus</i> • S19 ◊ RB51	• 4 - 7 maande oud ◊ 3 - 8 maande voor eerste dekseisoen
	Respiratoriese kombinasies (BVD, IBR, PI3 en BRSV)	7 maande en dan 1-2 maande voor eerste dekseisoen

Bulle	Multi-klostridiale entstof	Jaarlikse skraagdosis
	Lamsiekte	Jaarlikse skraagdosis

Koeie	Multi-klostridiale entstof	Skraagdosis in droë koeie
	Lamsiekte	Jaarlikse skraagdosis
	Knopvelsiekte	Jaarlikse skraagdosis in lente
	Miltsiekte	Jaarlikse skraagdosis (Vermag laat dragtigheid)
	Respiratoriese kombinasies (BVD, IBR, PI3 en BRSV)	Jaarlikse skraagdosis na kalwing
	<i>Brucella abortus</i> (RB51)	Na kalwing, voor dekseisoen (S19 mag nie herhaal word nie)
	Hondsolheid (ZeroRab)	Sien produk voubljiet

INENTINGS- & DOSERINGSPROGRAMME

INENTINGSPROGRAM VIR VIR SKAPE

GROEP:	ENTSTOF / ORGANISME:	TOEDIENING:
Lammers	Multi-klostridiale entstof, met bloednier ingesluit	Speentyd, herhaal 21 dae later
	Miltsiekte	Speentyd
	Bloutong	Speentyd (al 3 entstowwe)
	Slenkdalkoors	Speentyd
	<i>Mannheimia haemolytica</i> (<i>Pasteurella</i>) longontsteking	Speentyd of soos aangedui op etiket
	Absesse	Voorspeen en 'n skraagdos is moet gegee word soos aangedui
	Orf / Vuilbek	Vanaf dagoud
	Lamsiekte	Speentyd
	Hartwater	1 - 7 dae oud, monitor lammers vir reaksies
	<i>Brucella</i> Rev 1	Ent net ramlammers (stoet) op speenouderdom
	WIREVAX <i>Haemonchus contortus</i>	Konsulteer jou agent / veearts

Ooie	Multi-klostridiale entstof, wat bloednier en klem-in-die-kaak insluit	Laaste paar weke van dragtigheid
	Miltsiekte	Jaarliks, maar nie tydens laat dragtigheid nie
	Bloutong	Jaarliks, in lente maar vermy eerste derde van dragtigheid
	Ensoötiese aborsie <i>Chlamydia</i>	Voor dekseisoen
	Orf / Vuilbek	Soos benodig
	<i>Corynebacterium ovis</i> absesse	Jaarlikse skraagdos is voor skeerlyd
	<i>Mannheimia haemolytica</i> longontsteking	Voor gevaar tydperk bv. herfs
	Lamsiekte	Jaarlikse skraagdos is
	WIREVAX <i>Haemonchus contortus</i>	Konsulteer jou agent / veearts

Ramme	Multi-klostridiale entstof, wat bloednier insluit	Jaarlikse inenting
	Bloutong	Jaarlikse inenting
	<i>Mannheimia haemolytica</i> longontsteking	Voor gevaar tydperk bv. herfs
	WIREVAX <i>Haemonchus contortus</i>	Konsulteer jou agent / veearts

KLEINVEE DOSERINGSPROGRAM GEBASEER OP TEELSIKLUS

GROEP:	TYD / PARASIE:	PRODUK:
Ramme	4 - 6 weke voor dekseisoen begin Beheer rondewurms en lintwurms	ERADIWORM[®] TAPE ECOMECTIN 1%

Ooie	2 - 3 weke voor lamseisoen begin Beheer rondewurms en lintwurms	ERADIWORM[®] TAPE ECOMECTIN 1%
	Een maand voor lam Beheer rondewurms en lintwurms	ERADIWORM[®] TAPE
	30 dae na lam	
	Beheer rondewurms en lintwurms	ERADIWORM[®] TAPE

Lammers	30 dae na lam Beheer rondewurms en lintwurms	ERADIWORM[®] TAPE
	60 dae na lam Beheer rondewurms en lintwurms	ERADIWORM[®] TAPE ECOTEL 2.5%
	By speentyd Beheer rondewurms en lintwurms	ERADIWORM[®] TAPE
	2 weke voor lammers mark toe gestuur word Beheer rondewurm en neuswurm	ERADIWORM[®] PLUS

OPSIONELE ENTSTOF (Raadpleeg jou veearts):

Hondsdolheid (**ZeroRab**) | Volgens produk voublitj

Beste om ontwormingskedule te bepaal en produkdoeltreffendheid te monitor deur mis-eier-telling-reduksie toetse.

Praat met jou Afrivet agent oor hoe Wirevax deel kan vorm van jou entingsprogram.



INENTINGS- & DOSERINGSPROGRAMME

INENTINGSPROGRAM VIR BOKKE

GROEP:	ENTSTOF / ORGANISME:	TOEDIENING:
Lammers	Multi-klostridiale entstof, met bloednier ingesluit	Speentyd, herhaal 21 dae later
	Miltsiekte	Speentyd
	Slenkdalkoors (Iewendig)	Speentyd
	<i>Mannheimia haemolytica</i> longontsteking	Speentyd of volgens produk voubiljet
	Orf / Vuilbek	Van dag oud.
	Hartwater	1 - 21 dae oud, monitor lammers vir reaksies
Ooie	Multi-klostridiale entstof, wat bloednier en klem-in-die-kaak insluit	Laaste paar weke van dragtigheid
	Miltsiekte	Jaarlikse enting maar nie tydens laat dragtigheid nie
	Ensoötiese aborsie (<i>Chlamydia</i>)	Voor dekseisoen
	Orf / Vuilbek	Soos benodig
Ramme	<i>Mannheimia haemolytica</i> (<i>Pasteurella</i>) longontsteking	Voor die gevaar tydperk bv. winter
	Multi-klostridiale entstof wat bloednier insluit	Jaarlikse inenting
	<i>Mannheimia haemolytica</i> longontsteking	Voor die gevaar tydperk bv. winter

OPSIONELE ENTSTOF (Raadpleeg jou veearts):

Hondsdolheid (**ZeroRab**) Volgens produk voubiljet

INENTINGSPROGRAM VIR BRAAIKUIKENS

AGE (DAE):	SIKTE:	ROETE:
Dag 0 - 1, by broeihuis	Newcastlesiekte, Aansteeklike bronchitis virus, Besmetlike bursale siekte	Growwe sproei/ drinkwater
Dag 10	Newcastlesiekte, Aansteeklike bronchitis virus	Sproei
Dag 14	Besmetlike bursale siekte	Drinkwater
Dag 18	Newcastlesiekte	Drinkwater

Inentingsprogram word gebaseer op die spesifieke plaas se uitdaging.

VIR MEER INLIGTING: +27 12 817 9060 - www.afrivet.co.za

Afrivet Business Management (Edms) Bpk, Mpy, Reg. No.: 2000/011263/07,
 Posbus 2009, Faerie Glen, 0043, RSA. Tel: +27 12 817 9060. Web: www.afrivet.co.za, Hulplyn: 0860 833 2787

ANIMAL HEALTH IS IN OUR DNA

INENTINGS- & DOSERINGSPROGRAMME

INENTINGSPROGRAM VIR VARKE

GROEP:	OUDERDOM:	TOEDIENING:
VARKIES	By geboorte	Biesmelk innam baie belangrik Droogmaak van varkies Bind naelstring af Swak varkies: 2 ml ENERGYN oraal dag 1 en 2
	Dag 1 - 3 na geboorte	Yster inspuiting (binnespiers) Oor tatoeëring (geregisteerde tatoeëmerkm: Dierse identifikasie Wet) Stert amputasie (opsioneel) Oogtande knip (opsioneel) Ontsmetting van instrumente Produk: bv. A.C.T LA DISINFECTANT
	Dag 4 - 6 na geboorte	Anti-koksidiose middel
	Dag 10 - Speentyd	Kruipvoer (klein hoeveelhede, gereeld)
	Dag 10 - 14 na geboorte	2 ^{de} yster inspuiting (binnespiers) (opsioneel)
	Dag 21 na geboorte	Enting: Vark sirkovirus en <i>Mycoplasma hyopneumonia</i> Ontworming
DROË SOG EENHEID JONG SOGGIES	5 weke en 2 weke voor dekseisoen	Entings: parvovirus, leptospirose en diamantvelsiekte
	5 weke en 2 weke voor jonging	Inentings: <i>Escherichia coli</i> + <i>Clostridium</i> - vir varkies
	2 weke voor jonging	Interne en eksterne parasietbeheer Produk: ECOMECTIN 1% inspuikbaar
SÔE	2 weke voor dekseisoen (Skraagdosis)	Entings: parvovirus, leptospirose en diamantvelsiekte
	2 weke voor jonging (Skraagdosis)	Inentings: <i>Escherichia coli</i> + <i>Clostridium</i> - vir varkies
	2 weke voor jonging	Interne en eksterne parasietbeheer Produk: ECOMECTIN 1% inspuikbaar
BERE	Elke 6 maande	Entings: parvovirus, leptospirose en diamantvelsiekte Interne en eksterne parasietbeheer Produk: ECOMECTIN 1% inspuikbaar

OPSIONELE ENTINGS (Raadpleeg asb jou veearts):

Sôe en bere	Atrofiese rinitis Glässers (<i>Glaesserella parasuis</i>) Vark sirkovirus
Jong sôe	Atrofiese rinitis Glässers (<i>Glaesserella parasuis</i>) Vark sirkovirus <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>
Varkies	Edeemsiekte Ileitis (<i>Lawsonia intracellularis</i>)
Speenvark	Glässers (<i>Glaesserella parasuis</i>) <i>Actinobacillus pleuropneumonia</i> (APP)
Groeivark	Bere: Immunokastrasie

DIP KALIBRASIE

Die diptenk moet gekalibreer word voor dit gebruik kan word. Die kapasiteit van die minimum vlak (1.6 m vanaf bodem) en kapasiteit van die normale dip vlak (20cm) onder die afspringplek moet duidelik gemerk wees. Die dipvlak moet binne die perke wees indien diere gedip word. Daar is verskillende metodes om 'n diptenk te kalibreer:

1. Area oppervlak meting:

Omdat die diptenk nie 'n eenvoudige reghoek is nie, moet die gemiddelde lengte en die gemiddelde breedte uitgewerk word:

- Meet A = lengte van 'n vol dip vlak.
- Meet B = lengte van die bodem.

Gemiddelde lengte = $A + B$ en deel deur 2:

- Meet C = wydte van 'n vol dip vlak.
- Meet D = wydte van die bodem.

Gemiddelde wydte = $C + D$ en deel deur 2:

- Meet E = Diepte van tenk van normale dip vlak.

Bereken volgende:


Diepte van tenk (E) x gemiddelde breedte x gemiddelde lengte = meters x 1000 = kapasiteit van die tenk in liters by 'n normale dip vlak.

2. Vloeimeter:

Gebruik 'n vloeimeter, voeg water by en merk af by tussenposes van 1000 liter.

3. Handmeting van volume:

Gebruik 'n 200 liter drom, voeg water by en merk af by tussenposes van 1000 liter.



OUDERDOMSBEPALING VAN SKAPE EN BOKKE DEUR HUL TANDE

Onder 1 jaar (baba tande)




1 - 1.5 jaar (2-tand)




2 jaar (4-tand)



2.5 jaar (6-tand)



2.5 - 3 jaar (volbek)




> 3 jaar (gebreek)



Oud




OUDERDOMSBEPALING VAN BEESTE DEUR HUL TANDE



Onder 21 maande:
4 pare babatande en tydelike snytande.



Ses jaar:
Al 4 pare permanente snytande begin om af te werk.



Twee jaar:
1 paar volwasse snytande.



Sewe jaar:
Al 4 pare permanente snytande afgewerk.



Twee tot twee en 'n half jaar:
2 pare permanente snytande.
Twee en 'n half jaar tot 3 jaar:
3 pare permanente snytande.
Drie tot drie en 'n kwart jaar:
4 pare permanente snytande.



Dertien jaar:
Al 4 pare permanente snytande sleg afgewerk of al gebreek.

This image shows a blank sheet of white paper designed as a notebook page. At the top left, there is a solid red rectangular header bar with the word "NOTAS" written in white, bold, uppercase letters. The rest of the page is filled with horizontal grey lines, providing space for writing. On the far left edge, there is a decorative vertical strip featuring a pattern of small grey dots and larger, faint circular shapes, resembling a spiral binding or a stylized margin.

This image shows a blank sheet of white paper designed as a notebook page. At the top left, there is a solid red rectangular header bar with the word "NOTAS" written in white, bold, uppercase letters. The rest of the page is filled with horizontal grey lines, providing space for writing. On the far left edge, there is a decorative vertical strip featuring a pattern of small grey dots and larger, faint circular shapes, resembling a spiral binding or a stylized margin.

Hierdie besigheidsentiteit voorsien die betrokke inligting vervat hierin op 'n bona fide, goeie trou basis en dit moet geensins beskou word as 'n alomvattende voorstelling nie. Die relevante dokument is uitgereik met die bedoeling om slegs 'n handleiding van voorsorgmaatreëls vir die uitvoer van verpligtinge en hantering van die betrokke materiaal en/of produk deur 'n geskikte opgeleide persoon. Individue wat die betrokke inligting ontvang, moet die omstandighede in ag neem en hul eie diskresie gebruik wanneer die produk gebruik word vir die betrokke doel. DIE BESIGHEID VOORSIEN GEEN VOORSTELLING EN/OF WAARBORG, HETSY UITDRUKLIK EN/OF STILSWYEND EN/OF GEÏMPLISEER, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT ENIGE WAARBORGE VIR VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VAN DIE PRODUK VIR 'N BETROKKE DOEL TEN AANSIEN VAN DIE INLIGTING VOORSIEN NIE. GEVOLGLIK SAL DIE BESIGHEIDSENTITET GEEN AANSPEEKLIKHEID AANVAAR VIR ENIGE SKADE EN/OF NADEEL EN/OF NEWE EFFEKTE WAT SPRUIT UIT DIE GEBRUIK EN/OF WANGEBRUIK EN/OF MISBRUIK VAN DIE PRODUK WAT VERBAND HOU MET DIE VERTRoue OP DIE BETROKKE INLIGTING VOORSIEN NIE.

LABORATORIUM DIENSTE

Dipmonster analise

Die Afrivet laboratorium toets die konsentrasie van die aktiewe-bestanddeel in dipmonsters wat van diptenks of sproeigange geneem word.

As bosluis beheer in 'n kudde ondoeltreffend is, kan die sterkte van die produk wat gebruik word deel van die probleem wees. Ons bied ook ervare advies oor aanvullingskoerse en die rotasie van produkte aan.

**Die laboratorium
doen mis-eier-
tellings, mis-eier-
reduksie-tellings en
koksidia-oösis-
tellings.**

Bosluis identifikasie en arkarisied-weerstandig- heidstoetsing

Die laboratorium gebruik die Shaw Larf Onderdompelingstoets (SLOT) op bosluislarwes om te toets vir weerstandigheid teen amitras, chloorfenvinphos en sipermetrien. Dié help boere, agente en veeartse met die identifisering van weerstandige bosluisstamme en met die keuse van bosluisbeheerprodukte wat doeltreffend is.

ANIMAL HEALTH IS IN OUR DNA

VIR MEER INLIGTING: +27 12 817 9060 - www.afrivet.co.za

Afrivet Business Management (Pty) Ltd Co. Reg. No. 2000/01 1263/07

Posbus 2009, Faerie Glen, 0043 R.S.A. Tel: +27 12 817 9060 Web: www.afrivet.co.za Hulplijn: +27 860 833 2787.

LAB-AD-AFR-23-M7-V1

ANIMAL HEALTH IS IN OUR DNA®

